

गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच




COVID-19 टीकाकरण गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है

कृपया **COVID-19** उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखें



अपना मास्क
हमेशा पहनें



शारीरिक दूरी
बनाये रखें




हाथों को साबुन और
पानी से अच्छी तरह और
नियमित रूप से धोएं

अधिक जानकारी के लिये, संपर्क करें – <https://www.cowin.gov.in/faq>

#LargestVaccineDrive #Unite2FightCorona

COVID-19 के लक्षण जिन गर्भवती महिलाओं में पाए जाते हैं, उन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा अधिक होता है और भ्रूण पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए, गर्भवती महिलाओं को **COVID-19** वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है।



COVID-19 से संक्रमित होने का अधिक जोखिम किसे है?

- जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फ्रंटलाइन कर्मचारी हो।
- जिस समुदाय में **COVID-19** के संक्रमण की दर अधिक है।
 - जो बाहरी लोगों के संपर्क में आते हों।
- जो भीड़-भाड़ वाले घर में अतिरिक्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) न बना पाए।

COVID-19 टीकाकरण गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है

कृपया **COVID-19** उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखें



अपना मास्क
हमेशा पहनें



शारीरिक दूरी
बनाये रखें



हाथों को साबुन और
पानी से अच्छी तरह और
नियमित रूप से धोएं

अधिक जानकारी के लिये, संपर्क करें – <https://www.cowin.gov.in/faq>

#LargestVaccineDrive #Unite2FightCorona



गर्भावस्था के दौरान COVID-19 टीकाकरण

01

गर्भवती महिलाओं सहित 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति अब COVID-19 टीकाकरण के लिए पात्र हैं।

02

COVID-19 के लक्षण जिन गर्भवती महिलाओं में पाए जाते हैं, उन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा अधिक होता है और भ्रूण पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए, गर्भवती महिलाओं को COVID-19 वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है।

03

COVID-19 की जटिलता गर्भवती महिलाओं में बढ़ जाती है, विशेषकर:

- 35 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाएं
- जिन महिलाओं में मोटापा हो
- मधुमेह या उच्च रक्तचाप से ग्रसित महिलाएं
- जिनमें पहले से क्लोटिंग की समस्या हो

04

COVID-19 संक्रमित गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित खतरों की सम्भावना बढ़ जाती है:

- समय से पहले डिलीवरी
- नवजात शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होना
- कुछ परिस्थितियों में शिशु के जन्म से पहले मृत्यु हो सकती है

05

COVID-19 वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान कभी भी लगवाई जा सकती है और इसे जल्द से जल्द लगवाया जाना चाहिए।

06

यदि कोई महिला गर्भावस्था के दौरान COVID-19 संक्रमण से संक्रमित हो जाती है, तो उसे प्रसव के तुरंत बाद वैक्सीन लगाया जाना चाहिए।

07

गर्भावस्था में COVID-19 वैक्सीन सुरक्षित है। हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या 1-3 दिनों तक अस्वस्थ महसूस करने जैसे मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

08

भ्रूण और बच्चे के लिए वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव और सुरक्षा अभी तक स्थापित नहीं हुई है।

यदि आपको COVID-19 टीकाकरण के बाद निम्न में से कोई भी लक्षण होता है, तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें

सांस लेने में तकलीफ़, छाती में दर्द, लाल धब्बे या इंजेक्शन स्थल से दूर त्वचा के किसी हिस्से पर छाले होना, तेज़ या लगातार सिरदर्द, उल्टी के साथ या उसके बिना पेट दर्द, दौरे या धुंधला दिखाई देना।

कृपया COVID-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखें



अपना मास्क
हमेशा पहनें



शारीरिक दूरी
बनाये रखें



हाथों को साबुन और
पानी से अच्छी तरह और
नियमित रूप से धोएं

अधिक जानकारी के लिये, संपर्क करें – <https://www.cowin.gov.in/faq>

#LargestVaccineDrive #Unite2FightCorona

